

# TABELLA QUESTIONARIO SNOT-22

**DUPIXENT<sup>®</sup>**  
(dupilumab)  
300mg

| SNOT-22<br>Test di esito seno nasale a 22 voci           | Mai | Molto lievi | Lievi | Moderati | Gravi | Gravissimi | 5 più importanti |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|----------|-------|------------|------------------|
| 1. Necessità di soffiarsi il naso                        | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 2. Starnuti                                              | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 3. Rinorrea anteriore                                    | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 4. Ostruzione nasale                                     | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 5. Perdita dell'olfatto o del gusto                      | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 6. Tosse                                                 | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 7. Scolo retronasale                                     | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 8. Secrezioni nasali dense                               | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 9. Ovattamento auricolare                                | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 10. Vertigini                                            | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 11. Dolore auricolare                                    | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 12. Dolore/pesantezza al volto                           | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 13. Difficoltà ad addormentarsi                          | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 14. Risvegli notturni                                    | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 15. Sonno notturno poco riposante                        | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 16. Stanchezza al risveglio                              | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 17. Spossatezza                                          | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 18. Ridotta produttività                                 | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 19. Ridotta concentrazione                               | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 20. Senso di frustrazione/<br>irrequietezza/irritabilità | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 21. Tristezza                                            | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| 22. Imbarazzo                                            | 0   | 1           | 2     | 3        | 4     | 5          |                  |
| TOTALE (ogni colonna)                                    |     |             |       |          |       |            |                  |
| PUNTEGGIO TOTALE                                         |     |             |       |          |       |            |                  |

Rappresentazione grafica da 1.

Riservato al Personale Sanitario.

**SANOFI GENZYME**

# GUIDA PER UNA CORRETTA AUTOSOMMINISTRAZIONE DI DUPIXENT®

**DUPIXENT®**  
(dupilumab)  
300mg


## 1. PREPARAZIONE<sup>2</sup>

**Assicurarsi di avere le seguenti cose:**

- La penna pre-riempita con DUPIXENT®.
- 1 garza imbevuta di alcol.\*
- 1 batuffolo di cotone o garza.\*
- Un contenitore resistente alla perforazione (vedere passo 10).<sup>2</sup>

\*Articoli non inclusi nella confezione.

- ✗ Non conservare DUPIXENT® a temperatura ambiente per più di 14 giorni.<sup>2</sup>



## 2. ISPEZIONE<sup>2</sup>

**Controllare il medicinale<sup>2</sup>**

Guardare il medicinale attraverso la finestra di controllo della penna pre-riempita:

- Verificare che il liquido sia limpido e da incolore a giallo chiaro.<sup>2</sup>


## 3. ATTESA DI 45 MINUTI<sup>2</sup>

Appoggiare la penna pre-riempita su una superficie piana e lasciare che si scaldi naturalmente a temperatura ambiente (inferiore a 25 °C) per almeno 45 minuti.<sup>2</sup>

## 4. SCEGLIERE IL SITO DI INIEZIONE<sup>2</sup>

I siti di iniezione raccomandati sono:

- Coscia.
- Stomaco, fatta eccezione per i 5 cm attorno all'ombelico.
- Parte superiore del braccio. Se è la persona che presta le cure a somministrare la dose, potrà usare anche la parte esterna della parte superiore del braccio.<sup>2</sup>



- ✗ Non praticare l'iniezione attraverso i vestiti.<sup>2</sup>
- ✗ Non praticare l'iniezione in aree della pelle sensibili, danneggiate o che riportano ematomi e cicatrici.<sup>2</sup>

## 5. PULIZIA<sup>2</sup>

**Lavarsi le mani<sup>2</sup>**

**Preparare il sito di iniezione<sup>2</sup>**

- Disinfettare il sito di iniezione con una garza imbevuta di alcol.<sup>2</sup>
- Lasciare asciugare la pelle prima di praticare l'iniezione.<sup>2</sup>

## 6. RIMUOVERE IL CAPPUCCIO<sup>2</sup>

**Rimuovere il cappuccio verde<sup>2</sup>**

- Tirare il cappuccio verde mantenendolo dritto.<sup>2</sup>
- Non svitare il cappuccio verde.<sup>2</sup>
- Non rimuovere il cappuccio verde finché non si è pronti per praticare l'iniezione.<sup>2</sup>
- Non premere o toccare con le dita la protezione dell'ago di colore giallo. L'ago si trova all'interno.<sup>2</sup>

## 7. POSIZIONAMENTO<sup>2</sup>

- Nel posizionare sulla pelle la protezione dell'ago di colore giallo, tenere la penna pre-riempita in modo da poter vedere la finestra.<sup>2</sup>
- Posizionare sulla pelle la protezione dell'ago di colore giallo con un'angolazione di circa 90 gradi.<sup>2</sup>

- ✗ Non premere o toccare con le dita la protezione dell'ago di colore giallo. L'ago si trova all'interno.<sup>2</sup>

## 8. INIEZIONE<sup>2</sup>

**Premere verso il basso**

Premere la penna pre-riempita saldamente contro la pelle fino a quando non sarà più visibile la protezione dell'ago di colore giallo e tenerla premuta.<sup>2</sup>

- Si avvertirà un "clic" quando inizia l'iniezione.<sup>2</sup>
- La finestra inizierà a diventare gialla.<sup>2</sup>

L'iniezione può richiedere fino a 20 secondi.<sup>2</sup>

**Tenere saldamente**

Continuare a tenere saldamente la penna pre-riempita contro la pelle.

- Si può avvertire un secondo clic.<sup>2</sup>
- Controllare che tutta la finestra sia diventata di colore giallo.<sup>2</sup>
- Quindi, contare lentamente fino a 5.<sup>2</sup>
- Poi, estrarre la penna dalla pelle, l'iniezione è stata completata.<sup>2</sup>

Se la finestra non diventa completamente gialla, rimuovere la penna e chiamare l'operatore sanitario.<sup>2</sup>

- ✗ Non somministrare una seconda dose senza averne parlato con il proprio operatore sanitario.<sup>2</sup>

## 9. ESTRAZIONE<sup>2</sup>

- Dopo aver completato l'iniezione, tirare verso l'alto per rimuovere la penna pre-riempita dalla pelle e smaltire immediatamente come descritto nella sezione 10.<sup>2</sup>
- Se si vede del sangue sul sito di iniezione, tamponare delicatamente con un batuffolo di cotone o una garza.<sup>2</sup>

- ✗ Non sfregare la pelle dopo l'iniezione.<sup>2</sup>

## 10. SMALTIMENTO<sup>2</sup>

- Smaltire le penne pre-riempite (con l'ago all'interno) e i cappucci di colore verde in un contenitore resistente alla perforazione immediatamente dopo l'uso.<sup>2</sup>

- ✗ Non riapplicare il cappuccio verde.<sup>2</sup>